

AVERTISSEMENTS AGRICOLES

DLP 15-6-64 308088

BULLETIN
TECHNIQUE
DES
STATIONS
D'AVERTISSEMENTS
AGRICOLES

PUBLICATION PÉRIODIQUE

ÉDITION de la STATION de BORDEAUX (Tél. 92-26-94)

(GIRONDE, DORDOGNE, LOT-&-GARONNE, LANDES,
BASSES-PYRÉNÉES, CHARENTE, CHARENTE-MARITIME)

Régisseur de recettes de la Protection des Végétaux, Chemin d'Artigues, CENON (Gironde)
C. C. P. : BORDEAUX 6707-65

ABONNEMENT ANNUEL
15 NF

Supplément N° 2 au Bulletin Technique N° 45 de Juin 1964

1964-I6

AVERTISSEMENTS

VIGNE

Black-Rot : Comme prévu des taches de Black-Rot viennent d'apparaître à la suite des pluies abondantes du 22 au 31 mai. D'autres vont encore apparaître au début de la semaine prochaine.

Pour éviter l'extension des foyers et protéger la nouvelle végétation, nous conseillons un traitement dès réception de cette note.

Mildiou : A la suite des pluies importantes, les foyers se sont étendus dans les Charentes. Ailleurs, les taches sont peu nombreuses, ou bien la maladie se manifeste sous la forme de foyers. Il convient donc de prévoir un traitement général dès à présent.

ARBRES FRUITIERS

Carpocapse et Tavelures des Pommiers et des Poiriers : Les conditions climatiques restent favorables à l'évolution du Carpacap. Aussi il importe de prévoir l'application d'un insecticide pour éviter les attaques.

Dans les vergers où les taches de Tavelures sont nombreuses, adjoindre un fongicide à la Bouillie préconisée contre le Carpacap.

INFORMATIONS

VIGNE

Oïdium : L'Oïdium est en progrès. Il est recommandé de prévoir un poudrage au Soufre après les traitements conseillés contre le Black-Rot et le Mildiou.

ARBRES FRUITIERS

Coryneum du Pêcher : Des manifestations de la maladie viennent d'être observées sur les feuilles et les fruits. Pour éviter l'extension des invasions sur Pêches et la formation de Chancres sur rameaux, on pourrait prévoir l'application d'une spécialité à base de Thirame ou de Ziram.

Cochenilles du Prunier (Lécanium du Cornouiller). Cette Cochenille se présente sous la forme de coques globuleuses de couleur brun acajou fixées sur les branches. Elle est abondante dans plusieurs vergers. Les larves qui commencent à sortir seront bientôt disséminées sous les feuilles. Un traitement avec une spécialité à base d'Oléoparathion, d'Oléomalathion ou d'Oléoéthion devrait être envisagé dans le courant de la semaine prochaine.

Bordeaux, le 13 Juin 1964

Le Contrôleur chargé des Avertissements
C. ROUSSEL

L'Inspecteur de la Protection des Végétaux
J. BRUNETEAU

FLAVESCENCE DORÉE de la VIGNE

La Station de Zoologie Agricole du Sud-Ouest conseille l'application d'un nouveau traitement dans les vignobles de la zone atteinte par la Flavescence dorée.

Utiliser une spécialité à base de D.D.T. (200 grs de M.A. Hl.) ou de Parathion (30 grs de M.A./Hl.)

Imprimerie de la Station de Bordeaux
Directeur-Gérant: L. BOUYX

7139